

Colpotus Reitteri n. sp. (Col. Tenebr.).

Par Charles Zürcher à Basel.

Elongatus, parum convexus, niger, nitidus, antennis piccis, articulo primo rufo, extrorsum flavis: prothorace quadrato, lateribus tenuiter curvato, maxima ejus latitudine ante medium sita, infra lateribus fortiter et irregulariter punctato-strigoso, elytris latior; elytris parallelis, sulcato-punctatis, interstitiis convexis sat dense ac subtiliter punctatis, pedibus piccis tarsis rufescentibus.

♂ tarsis anterioribus valde dilatatis atque ciliatis. L = 6 — 9.5 mm.

Noir. tête densément et fortement ponctuée, aux quelques rides longitudinales surtout au les cotés. Thorax à peu près carré, un peu plus large que long, un peu plus large que les élytres: sa plus grande largeur en avant: arrondi devenant plus étroit vers la base, les cotés peu ou à peine sinués avant les angles postérieurs: une dépression longitudinale plus ou moins profonde de chaque coté devant la sinuosité basale; finement et peu densément ponctué, au milieu, à points plus forts et plus serrés au les cotés, mélangés de rides longitudinales dans les depressions.

Les cotés du thorax en dessous sont grossièrement ponctués ridés en long, le bord latéral est un peu en relief et obtus, marqué, plus ou moins distinctement de courtes stries transversales allant rejoindre les stries longitudinales.

Elytres allongés un peu ovales, à sillons profonds grossièrement ponctués, interstries convexes, la strie interne enfoncée au une faible longueur par devant. Les élytres sont presque deux fois plus longs que larges finement et densément ponctués.

Cuisses antérieures du ♂ pubescentes à l'intérieur, les tarsi antérieurs élargés et feutrés.

Environs de Nicosie (Ile de Cypro).

Je suis heureux de pouvoir dédier cette espèce à l'éminent entomologiste Edmund Reitter.